

Списокъ насекомыхъ, собранныхъ въ Шлиссельбургской  
крѣпости въ 1901 — 1904 гг. М. В. Новорусскимъ.

**Coleoptera (жуки).**

Опредѣлены Г. Г. Якобсономъ

при участіи Ф. А. Зайцева (*Dytiscidae, Hydrophilidae, Staphylinidae*),  
Д. А. Смирнова (*Curculionidae, Mordellidae*) и Ю. И. Бекмана  
(*Histeridae*).

*Cicindelidae.*

*Cicindela campestris* L.

*Carabidae.*

*Carabus clathratus* L. (8.IV).

„ *nemoralis* Ill.

*Notiophilus biguttatus* F.

*Blethisa multipunctata* L.

*Lorocera pilicornis* F. (7.IV.903).

*Clivina fossor* L. (14.IV.903).

*Bembidium nitidulum* Marsh.

„ *litorale* Ol. (902).

„ *quadrinaculatum* L.

*Trechus rubens* F. (7.IV.903).

*Eraphius secalis* Payk. (24.V).

*Patrobis excavatus* Payk.

*Calathus micropterus* Duft.

*Agonum assimile* Payk.

„ *muelleri* Herbst.

„ *quadripunctatum* Deg.

*Platysma nigrata* F.

„ *vulgare* L.

„ *oblongopunctatum* F.  
(8.IV).

„ *versicolor* Sturm.

*Amara plebeja* Gyll. (8.IV.903).

„ *convexior* Steph. (8.IV.  
903).

„ *aulica* Panz. (18.IV.903).

*Harpalus aeneus* F. (IV.903).

*Ophonus pubescens* Muell. (14.X).

*Dytiscidae.*

*Hydroporus tristis* Payk. (20.V).  
*Agabus congener* Payk.  
*Colymbetes paykulli* Er.  
*Acilius canaliculatus* Nic.  
*Dytiscus circumcinctus* Ahr.

*Staphylinidae.*

*Tachinus rufipes* Deg. (17.IV.903).  
" *collaris* Grav.  
*Tachyporus chrysomelinus* L.  
" *obtusus* L.  
" *hypnorum* F.  
*Mycetoporus splendens* Marsh.  
*Quedius mesomelinus* Marsh.  
" *xanthopus* Er.  
" *fuliginosus* Grav. (29.IV).  
*Creophilus maxillosus* L.  
*Staphylinus caesareus* Cederh.  
*Philonthus laminatus* Creutz.  
" *aeneus* Rossi.  
" *sordidus* Grav.  
*Eulissus fulgidus* F. (1.VI.904).  
*Xantholinus punctulatus* Payk.  
(1.V.903).

*Stenus tarsalis* Ljungh.  
*Oxyporus rufus* L.  
*Oxytelus rugosus* F. (12.V.903,  
3.IV).

*Anthophagus testaceus* Grav.  
*Phyllodrepa floralis* Payk.

*Silphidae.*

*Ptomophagus sericeus* Panz.  
*Necrophorus vespillo* L.

*Histeridae.*

*Hister carbonarius* Ill.  
*Gnathoncus rotundatus* Ill. (22.V).

*Cantharididae.*

*Lygistorus sanguineus* L.  
*Cantharis violacea* Payk. (30.V.  
903).  
" *livida* var. *dispar* F.  
" *fusca* L.  
" *nigricans* Muell.  
(30.V).

*Malthodes marginatus* Latr.

*Melyridae.*

*Malachius aeneus* L.

*Dascillidae.*

*Cyphon variabilis* Thunb.  
" *padi* L.

*Elateridae.*

*Adelocera fasciata* L.  
*Selatosomus aeneus* L. (2.VI).  
*Dolopius marginatus* L.  
*Agriotes lineatus* L. (902).  
*Adrastus pallens* L.  
*Melanotus rufipes* Herbst.  
*Elater pomonae* Steph.  
" *balteatus* L.  
*Athous niger* L.

*Ptinidae.*

*Ptinus fur* L.  
" *raptor* Sturm.  
*Anobium pertinax* L.

*Cisidae.*

*Cis cornutum* Gyll.

*Oedemeridae.*

*Nacerda melanura* L. (5.VI.903).

*Mordellidae.*

*Anaspis frontalis* L. (4.VI).  
" *lateralis* F.

*Tenebrionidae.*

*Tenebrio molitor* L.

*Cerambycidae.*

*Xylotrechus rusticus* L.

*Oxymirus cursor* L.

*Acmaeops pratensis* Laich. (4.VI).

*Leptura dubia* Scop.

„ *rubra* L. (10.VI).

„ *virens* L.

*Strangalia quadrifasciata* L.

*Monohammus sutor* L. (14.VIII).

„ *quadrimaculatus*  
Motsch.

*Saperda scalaris* L.

*Chrysomelidae.*

*Donacia clavipes* F.

*Crioceris merdigera* L.

*Adoxus obscurus* L. (901).

*Gastroidea viridula* Deg.

„ *polygoni* L. (15.VI).

*Chrysomela graminis* L.

„ *polita* L. (4.VI).

„ *staphylea* L.

*Phaedon cochleariae* F.

*Phyllodecta vitellinae* L.

*Melasoma populi* L.

„ *aeneum* L.

*Agelastica alni* L.

*Lochmaea capreae* L.

*Galerucella lineola* F.

*Chalcoides helxines* L. (17.V).

*Aphthona coerulea* Payk. (28.V).

*Phyllotreta undulata* Kutsch. (901,  
903).

*Cassida viridis* L.

„ *nebulosa* L.

*Ipididae.*

*Myelophilus piniperda* L.

*Polygraphus polygraphus* L.

*Pityogenes chalcographus* L.

*Curculionidae.*

*Phyllobius urticae* Deg. (31.V).

*Hylobius abietis* L.

*Coeliodes urticae* Scop.

*Orchestes salicis* L.

„ *saliceti* F.

*Rhyncolus chloropus* L.

*Magdalis pruni* L.

„ *phlegmatica* Herbst.  
(15.IV).

*Scarabaeidae.*

*Aphodius subterraneus* L.

„ *fimetarius* L.

„ *foetens* F.

*Geotrypes stercorarius* L.

„ *silvaticus* Panz.

*Melolontha hippocastani* F. (902).

*Amphimallus solstitialis* L.

*Anomala aenea* Deg. (25.VIII).

*Potosia cuprea* F. (VII.902).

*Trichius fasciatus* L.

*Dermestidae.*

*Dermestes lardarius* L. (902).

*Anthrenus museorum* L. (7.IV.903,  
17.V).

*Attagenus piceus* Ol.

*Byrrhidae.*

*Byrrhus pilula* L. (17.V).

„ *fasciatus* Forst. (8.VI,  
17.V).

*Cytilus sericeus* Forst. (3.VI).

*Hydrophilidae.*

*Philhydrus fuscipennis* C. Thoms.  
*Cercyon analis* Payk.

*Byturidae.*

*Byturus tomentosus* Deg. (7.VI).

*Mycetophagidae.*

*Mycetophagus piceus* F. (29.V).  
*Lithargus connexus* Fourcr.

*Nitidulidae.*

*Heterhelus solani* Heer.  
*Brachypterus urticae* L.  
*Epuraea florea* Er.  
*Meligethes aeneus* F.  
*Omosita colon* L.  
*Glischrochilus quadripunctatus* Ol.  
(29.V).

*Colydiidae.*

*Synchita humeralis* F.

*Lathridiidae.*

*Corticaria similata* Gyll.  
*Lathridius consimilis* Mannh.

*Coccinellidae.*

*Coccinella bipunctata* L. съ var.  
*quadrimaculata* L.  
" *septempunctata* L.  
" *quinquepunctata* L.  
(11.V.903).  
" *quatuordecimpunctata* L.  
" *quatuordecimguttata* L.  
*Hippodamia tredecimpunctata* L.  
(9.V.903).  
" *septemmaculata* Deg.  
(9.V.903).  
*Coccidula rufa* Herbst. (1.VI).

**Lepidoptera (бабочки).**

Опредѣлены Н. Я. Кузнецовымъ.

*Brenthis ino* Esp.  
*Polygonia c-album* Linn.  
*Vanessa urticae* Linn.  
*Pyrameis atalanta* Linn.  
*Aphantopus hyperanthus* Linn.  
*Plebejus argus* Linn.  
*Pieris rapae* Linn.  
" *nopi* Linn.  
" *brassicae* Linn.  
*Colias rhamni* Linn.  
*Adscita statices* Linn.  
*Spilosoma lubricipeda* Linn.  
*Hypercampa caja* Linn.  
*Notolophus antiquus* Linn.  
*Melalopha anachoreta* Fabr.

*Hyloecus ligustri* Linn.  
*Amorpha populi* Linn.  
*Falcaria lacertinaria* Linn.  
*Lasiocampa quercus* Linn.  
*Acronycta psi* Linn. (?).  
*Viminia rumicis* Linn.  
*Agrotis exclamationis* Linn.  
*Peridroma occulta* Linn.  
*Mamestra brassicae* Linn.  
" *thalassina* Rott.  
*Hadena gemina* Hübn.  
" *secalis* Bjerk.  
*Euplexia lucipara* Linn.  
*Luceria virens* Linn.  
*Cirrhia fulvago* Linn.

<i>Lithophane socia</i> Rott.	<i>Hepialus humuli</i> Linn.
<i>Scoliopteryx libatrix</i> Linn.	<i>Crambus nemorellus</i> Hübn.
<i>Pyrophila tragopoginis</i> Linn.	<i>Salebria</i> sp.
<i>Plusia moneta</i> Fabr.	<i>Aglossa pinguinalis</i> Linn.
„ <i>pulchrina</i> Haw.	<i>Pyralis farinalis</i> Linn.
„ <i>gamma</i> Linn.	<i>Pionea forficalis</i> Linn.
„ <i>interrogationis</i> Linn.	<i>Eurrhyncha urticata</i> Linn.
<i>Hypena rostralis</i> Linn.	<i>Scoparia murana</i> Curt.
<i>Eois aversata</i> Linn. ab. <i>spoliata</i>	<i>Platyptilia ochrodactyla</i> Hübn.
Staud.	<i>Tortrix bergmanniana</i> Linn.
<i>Operophtera boreata</i> Hübn.	<i>Cacoecia rosana</i> Linn.
<i>Eustroma prunata</i> Linn.	<i>Laspeyresia woeberiana</i> Schfff.
<i>Pelurga comitata</i> Linn.	<i>Olethreutes lacunana</i> Dup.
<i>Xanthorrhoe fluctuata</i> Linn.	<i>Choreutis myllerana</i> Fabr.
„ <i>montanata</i> Schiff.	<i>Plutella maculipennis</i> Curt.
„ <i>didymata</i> Linn.	<i>Lampronia rubiella</i> Bjerk.
<i>Plemyria hastata</i> Linn.	<i>Incurvaria redimitella</i> Zell.
<i>Tephroclystia vulgata</i> Haw.	<i>Endrosis lacteella</i> Schiff.
„ <i>sinuosaria</i> Eversm.	<i>Depressaria applana</i> Fabr.
<i>Chloroclystis rectangulata</i> Linn.	<i>Argyresthia goedartella</i> Linn.
<i>Dilinia pusaria</i> Linn.	<i>Gracilaria syringella</i> Fabr.
<i>Euchlaena prunaria</i> Linn.	<i>Tineola biselliella</i> Humm.
<i>Eubyia betularia</i> Linn.	

**Orthoptera (прямокрылыя).**

Опредѣлены Н. Н. Аделунгомъ.

*Blattodea.*

*Blatta germanica* L., 2 ♀ ♀, 2 личинки.

*Stylopyga orientalis* L. 1 ♂, 1 ♀.

*Periplaneta americana* L. лич. ♀<sup>1)</sup>.

*Acridiodea.*

*Stenobothrus vagans* Eversm. 1 ♀<sup>2)</sup>.

„ *bicolor* Charp. 1 ♀.

„ *elegans* Charp. 1 ♀.

*Locustodea.*

*Platycleis brachyptera* L. 1 ♂.

*Decticus verrucivorus* L. 1 ♂.

<sup>1)</sup> Не безынтересно отмѣтить находеніе этого вида въ Шлиссельбургѣ: *P. americana* завозится въ портовые города Европы вмѣстѣ съ товаромъ и въ С.-Петербургѣ уже водится постоянно на мыловаренномъ заводѣ Жукова и въ нѣкоторыхъ баляхъ; отсюда онъ, очевидно, проникъ и въ Шлиссельбургъ.

<sup>2)</sup> Этотъ на югѣ Россіи довольно обыкновенный видъ (Черниговская, Саратовская и Оренбургская губ.) на сѣверѣ встрѣчается сравнительно рѣдко и до

**Hemiptera (полужесткокрылыя).**

Опредѣлены В. Θ., Ошанинымъ.

<i>Dolycoris baccarum</i> L. ♂.	<i>Notonecta glauca</i> L. ♀.
<i>Eurydema dominulus</i> Scop. ♀.	<i>Aphrophora salicis</i> Deg. ♂.
<i>Picromerus bidens</i> L. ♂.	<i>Philaenus spumarius</i> L. ♂.
<i>Elasmostethus interstinctus</i> L. ♀, 27.V, на березѣ.	” ” var. <i>biguttatus</i> F. ♀.
<i>Clinocoris fieberi</i> Jak. ♂.	<i>Bythoscopus flavicollis</i> L. ♂, 2 ♀, 14.VI, на березѣ.
<i>Scolopostethus decoratus</i> Hhn. ♀.	<i>Pediopsis scutellata</i> Boh. ♀.
<i>Gerris odontogaster</i> Zett. ♂, 18.V.	<i>Acocephalus flavostriatus</i> Don. 2 ♂, ♀.
<i>Pygolampis bidentata</i> Fourcr. ♂.	<i>Empoasca smaragdula</i> Fall. ♂, 20.VI.
<i>Nabis ferus</i> L. ♀.	<i>Eupteryx urticae</i> L. ♀.
<i>Cimex lectularius</i> L. ♂.	<i>Aphididae</i> неопредѣленныхъ 12 экз.
<i>Calocoris biclavatus</i> H. S. ♂.	<i>Pediculus capitis</i> L. 1 экз.
<i>Liocoris tripustulatus</i> Fabr. 2 ♀.	
<i>Lygus viridis</i> Fall. ♂, ♀, 13.VI.	
” <i>pratensis</i> Fab. ♀.	
<i>pratensis</i> var. <i>campestris</i> Fab. ♀.	

**Hymenoptera (перепончатокрылыя).**

*Aculeata* опредѣлены Л. М. Вольманомъ, кромѣ муравьевъ, которые опредѣлены М. Д. Ружскимъ; *Ichneumonidae* и *Braconidae* опредѣлены Н. Р. Кокуевымъ.

<i>Trypoxylon figulus</i> L.	<i>Formica rufa</i> L. ♀ и ♂.
<i>Vespa rufa</i> L.	<i>Myrmica laevinodis</i> Nyl. ♀ и ♂.
” <i>sylvestris</i> Scop.	” <i>laevinodo-ruginodis</i> Fou. ♀ и ♂.
” <i>crabro</i> L.	<i>Prosopis annulata</i> L. ♂ и ♀.
<i>Odynerus bifasciatus</i> L.	<i>Halictus sexnotatus</i> Nyl.
” <i>antilope</i> Panz.	<i>Andrena albicrus</i> Müll.
<i>Camponotus herculeanus</i> L. s. str. ♀, ♂ и ♂.	<i>Megachile rotundata</i> F. ♂ и ♀.
<i>Lasius fuliginosus</i> Ltr. ♀.	” <i>circumcincta</i> K.
” <i>niger</i> L. ♀, ♂ и ♂.	<i>Eucera longicornis</i> Scop.

сихъ поръ былъ показанъ лишь для Вятской губ. Въ виду этого находение *St. vagans* въ Шлиссельбургѣ представляетъ значительный интересъ въ зоогеографическомъ отношеніи и въ то же время обогащаетъ ортоптерофауну С.-Петербургской губ. однимъ новымъ видомъ.

*Podalirius fuscatus* Panz.  
*Bombus terrestris* L. ♂, ♀ и ♀.  
 „ *pratorum* L.  
 „ *agrorum* F.  
*Apis mellifica* L. ♂, ♀ и ♀.  
*Ichneumon leucomelas* Gmel.  
*Amblyteles johansonii* Holmgr.  
*Platylabus decipiens* Wsm. (?).  
 „ *muticus* Thoms.  
*Alomya debellator* Fbr.  
*Phygadeuon trichops* Thoms.  
*Acanthocryptus* sp.  
*Microcryptus puncticollis* Thoms.  
 „ *sudeticus* Grav.  
 „ *nigrocinctus* Grav.  
*Hemiteles bicolorinus* Grav.  
 „ *inimicus* Grav.?  
*Plectiscus* sp.  
*Callidistes coxator* Grav.

*Alexeter melanocephalus* Grav.  
 „ *ruficornis* Grav.  
*Mesoleius* sp.  
*Tryphon ceratophorus* Thoms.  
 „ sp.  
*Exochilum circumflexum* L.  
*Opheltes glaucopterus* L.  
*Sagarites mucronella* Thoms.  
*Mesochorus vitticollis* Hlmgr.  
*Pristomerus vulnerator* Grav.  
*Pimpla inquisitor* Scop.  
 „ *mandibularis* Grav.  
 „ *turionellae* L.  
*Apanteles glomeratus* L. (?).  
*Macrocentrus abdominalis* F.  
*Diachasma fulgida* Hal.  
*Adelura florimela* Hal.  
*Phaenocarpa* sp.  
*Aspilota nervosa* Hal.

Кромѣ того *Allotria* sp. сем. *Cynipidae* и еще 5 видовъ сем. *Cynipidae*, оставшіеся неопредѣленными.

### Neuroptera и Trichoptera (сѣтчатокрылыя и пухокрылыя).

Опредѣлены М. Н. Римскимъ-Корсаковымъ.

#### *Panorpidae.*

*Panorpa communis* L.

#### *Hemerobiidae.*

*Hemerobius nervosus* F.

*Chrysopa perla* L.

„ *septempunctata* Wesm.

#### *Phryganeidae.*

*Phryganea grandis* L.

„ *striata* L.

*Neuronia clathrata* Kol.

#### *Limnophilidae.*

*Limnophilus auricula* Ct.

„ *nigriceps* Zett.

#### *Sericostomatidae.*

*Lasiocephala basalis* Koll.

*Silo nigricornis* P.

#### *Leptoceridae.*

*Berala pullata* Ct.

*Setodes tineiformis* Ct.

<i>Leptocerus dissimilis</i> St.	<i>Hydropsychidae.</i>
„ <i>alboguttatus</i> Hg.	<i>Hydropsyche</i> 2 sp.
„ <i>albifrons</i> L.	<i>Philopotamus montanus.</i>
„ <i>annulicornis</i> Steph	<i>Polycentropus</i> sp.
„ <i>nigronervosus</i> Retz.	<i>Tinodes pallidula</i> ML. <sup>1)</sup> .

---

<sup>1)</sup> 147 видовъ *Diptera* и 23 вида *Tenthredinoidea* остались неопредѣленными. Представлены были сверхъ того 34 коробочки съ препаратами по развитію различныхъ насѣкомыхъ.

---

Отдѣльный оттискъ изъ „Трудовъ Русскаго Энтомологическаго Общества“, т. XXXVIII, 1907, стр. CXXXVIII—CXLV.

Напечатано по распоряженію Совѣта Русскаго Энтомологическаго Общества.  
Май 1907 г. Редакторъ Н. Я. Кузнецовъ.